РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ЯМБОЛ

X

ДО ДИРЕКТОРА НА
ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“
ГР.ЯМБОЛ

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЯМБОЛ

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ТУНДЖА

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛХОВО

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТНОСНО: Поява, плътност и мерки за борба с обикновената полевка (*Microtus arvalis*) при есенните житни посеви (пшеница, ечемик) и рапица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ямбол Ви уведомява, че при извършените теренни обследвания на територията на областта се отчита трайно нарастване на плътността на **обикновената полевка (*Microtus arvalis*)**, с концентрация на активни колонии в младите посеви от **зимна пшеница, ечемик и рапица**.

Най-силно нападнати са блоковете с есенници в ранни фази от развитието (поникване – братене), особено тези, които са засяти след предшественици слънчоглед и царевица с минимални почвени обработки (директна сеитба или плитко дискуване), както и посевите, граничещи с люцерни, ливади, пасища, необработваеми площи и крайпътни ивици. В редица

✉ **Гр. Ямбол, п.к. 8600 , ул. „Батак” 1**
☎ **046/66 36 26,** 🖷 **046/66 36 26,** **www.bfsa.egov.bg**

☐ Ниво 3, TLP-RED ☐ Ниво 2, TLP-AMBER ☒ Ниво 1, TLP-GREEN ☐ Ниво 0, TLP-WHITE

масиви плътността достига и надвишава **Прага на икономическа вредност (ПИВ) – 2 активни колонии на декар**. Гризачите изгризват надземната зелена маса и възела на братене, което води до разреждане на посевите, образуване на характерни голи петна (плешивини) и риск от измръзване на растенията през зимата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АГРОТЕХНИКА И БОРБА:

1. **Провеждане на редовни обследвания в посевите:**
   - Извършвайте системни огледи на посевите от пшеница, ечемик и рапица като започнете от периферията на блоковете и постепенно навлизате към вътрешността;
   - За точно отчитане на плътността заложете пробни площадки (по 1 дка на всеки утъпчете всички видими отвори в тях и на следващия ден пребройте новоотворените (активни) дупки.;
2. **Агротехнически обработки и превенция;**
   - **Дълбока оран на съседните площи.** Извършвайте своевременна дълбока оран (на 25–30 см) на съседните свободни парцели и стърнища. Това механично разрушава подземните гнезда, складовете за храна и тунелните системи, като унищожава значителна част от популацията и спира миграцията към есенниците;
   - **Дискуване и унищожаване на самосевките.** Поддържайте съседните площи чисти от самосевки и плевелна растителност чрез редовно дискуване и култивиране, за да лишите полевките от хранителна база и укритие.;
   - **Валиране на младите посеви.** При подходяща почвена влажност и състояние на растенията в ранните фази от развитието на пшеницата може да се приложи валиране, което уплътнява горния почвен слой, затруднява прокопаването на плитки ходове и подобрява вкореняването на посева;
   - **Почистване на синори и необработваеми ивици.** Окосявайте и почиствайте тревната растителност по слоговете, канавките и крайпътните ивици около житните масиви, които служат като основен резервоар за презимуване и разселване на вредителя;
   - **Биологичен контрол.** Поставяйте високи Т-образни кацалки (2–3 метра) в краищата и вътрешността на житните блокове за привличане на естествените неприятели (мишелови, керкенези, сови).
3. **Химична борба (при достигане на ПИВ – 2 активни колонии/дка в пшеницата):**
   - При плътност равна или по-висока от **2 активни колонии на декар** пристъпете към третиране с **разрешени за употреба продукти за растителна защита (родентициди)**, вписани в Регистъра на БАБХ, при стриктно спазване на разрешената доза и указанията на етикета. .Закупуването и прилагането им се извършва само от лица със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията
   - **Техника на залагане:** Примамките се поставят **дълбоко в самите активни ходове** (с апликатор или лъжица), след което отворът се притъпква или зарива леко с пръст, без да се затрупва самата примамка.

ЗАБРАНЯВА СЕ разхвърлянето на родентициди по повърхността на почвата с цел предпазване на полезния дивеч, дивите птици и домашните животни.Използвайте задължително лични предпазни средства (защитни ръкавици) при работа с препаратите.

Важно: Преди провеждане на третирания с продукти за растителна защита земеделските стопани са длъжни да спазват изискванията на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

На основание чл. 14 от Закона за защита на растенията, всички лица са длъжни да поддържат в добро здравно състояние растенията и растителните продукти, които притежават, отглеждат, произвеждат или съхраняват.

С уважение,

X

д-р Анастас Калудов
Директор ОДБХ-Ямбол